

Edad de riesgo de sufrir embolia desciende de 70 a 40 años

Anuncian para febrero el XV Congreso Internacional de Avances de Medicina

Dado el estilo actual de vida de la población, en el que abundan los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, el sobrepeso y la hipertensión, el factor de riesgo de sufrir una embolia comienza ahora desde los 40 años de edad y no a partir de los 70 años, señalaron médicos adscritos al Hospital Civil de Guadalajara al anunciar esta mañana el XV Congreso Avances de Medicina 2013. "Voluntad, responsabilidad y acciones en salud", a celebrarse en nuestra ciudad del 21 al 23 de febrero.

Los médicos Roberto Hinojosa Ibarra, Rafael Camacho Cortés, José Huitrón Ramírez, Ricardo Ascencio Tene, Juan Manuel Rodríguez Lizola y Lorena Valerdi Contreras explicaron que la enfermedad vascular cerebral isquémica (EVC), mejor conocida como embolia cerebral, se presenta en 30 por ciento de las personas con diabetes y hasta en 70 por ciento en pacientes con problemas de hipertensión, sobrepeso y obesidad.

Una vez que se presenta una crisis, 50 por ciento de quienes la sufren quedan con algún problema permanente y de ese 50, 20 por ciento quedan con alguna parálisis o limitación física en la que subsisten después bajo dependencia total de algún familiar o de otra persona, mientras el 30 por ciento restante aunque no quedan tan dañados, sí les impide realizar con comodidad sus actividades cotidianas.

Añadieron que la EVC se caracteriza como un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro con la consecuente afectación, de manera transitoria o permanente, de la función generalizada del cerebro o de una zona más pequeña o focal, sin que exista otra causa aparente que el origen vascular.

Es tan grave este problema, que al año mueren en el mundo cerca de seis millones de personas a causa de una EVC y constituye la segunda causa de muerte en personas mayores de 60 años y la quinta causa en personas de 15 a 59 años de edad. En la actualidad la EVC constituye la primera causa de discapacidad permanente a escala mundial, por las secuelas que deja en los pacientes una vez que se ha producido.

Este tema será abordado de manera profunda durante el congreso internacional, en el que están invitados a participar destacados especialistas en la materia. Durante el mismo se debatirá acerca de cuáles son los principales factores de riesgo, las medidas preventivas que deben implementarse entre la población, así como la forma de tratar la enfermedad una vez presentados sus primeros síntomas.

Mayores informes en: <http://www.hcgcongreso.com> [1].

Guadalajara, Jal., 11 de enero de 2013

Texto: Juan Carrillo Armenta

Fotografía: Adriana González

Edición de noticias en la web: Lupita Cárdenas Cuevas

Etiquetas:

[Congreso Internacional de Avances de Medicina](#) [2]

[embolia](#) [3]

[hcg](#) [4]

[José Huitrón Ramírez](#) [5]

[Juan Manuel Rodríguez Lizola](#) [6]

[Lorena Valerdi Contreras](#) [7]

[Rafael Camacho Cortés](#) [8]

[Ricardo Ascencio Tene](#) [9]

[Roberto Hinojosa Ibarra](#) [10]

URL Fuente: <https://www.comsoc.udg.mx/noticia/edad-de-riesgo-de-sufrir-embolia-desciende-de-70-40-anos>

Links

[1] <http://www.hcgcongreso.com>

[2] <https://www.comsoc.udg.mx/etiquetas/congreso-internacional-de-avances-de-medicina>

[3] <https://www.comsoc.udg.mx/etiquetas/embolia>

[4] <https://www.comsoc.udg.mx/etiquetas/hcg>

[5] <https://www.comsoc.udg.mx/etiquetas/jose-huitron-ramirez>

[6] <https://www.comsoc.udg.mx/etiquetas/juan-manuel-rodriguez-lizola>

[7] <https://www.comsoc.udg.mx/etiquetas/lorena-valerdi-contreras>

[8] <https://www.comsoc.udg.mx/etiquetas/rafael-camacho-cortes>

[9] <https://www.comsoc.udg.mx/etiquetas/ricardo-ascencio-tene>

[10] <https://www.comsoc.udg.mx/etiquetas/roberto-hinojosa-ibarra>